

Lau-Ce-Chjur

Endemicky žijící poddruh lišky s výskytem nedaleko Kun Haongu. Její nádherné dlouhé chlupy barvy slámy díky symbióze s bakteriemi v noci světelně a dodávají jí tak tajemný nazelenalý nádech. Strava je totožná jako s běžnou liškou. Chování je však značně odlišné. Souboje o přízeň samice, kterou poznáte podle límce zrzavých chlupů jsou spíše módní přehlídkou. Samec s nejkrásnější oháňkou vyhrává přízeň samice, se kterou vytvoří celoživotní pár. Z tohoto důvodu si samci často mimo období říje vzájemně poškozují ocasy. Narozdíl od lišky má dvě tajné zbraně. První z nich jsou klasické jedové zuby, které obsahují neuvěřitelně silnou kyselinu mravenčí. Druhou tajnou zbraní je o kus dále v tlamě usazený bodec. Ten se při správném kousnutí aktivuje a může soupeře infikovat bakteriemi, na které je tato liška imunní. Ale jakmile se napadenému cíly dostanou do těla spustí genocidu střevních bakterií a tak způsobují silné křeče břicha a nekontrolovatelný průjem. Když je predátor dost vyčerpán dorazí jej klasickým kousnutím.

Síla	Obratnost	Odolnost	Mysl	Počet životů	Základní poškození
0	3	1	x/1	45	12
Speciální útok: Jedové zuby - jde o šípový jed způsobující základní jednorázové poškození 20. Tento jed kromě fyzického zranění také způsobí, že protivník Lau-Ce-Chjur má na jednu hodinu postih na útok +15. Pokud Lau-Ce-Chjur způsobí jedem jakékoli poškození své protistraně, po 12 hodinách dochází také k rozvoji infekce obsažené v jejích ústech. Tato nákaza se mezi lidmi nazývá Kletbou Lau. Toto onemocnění má následující charakteristiku: Pravděpodobnost nákazy : 100% při úspěšném útoku jedem Poškození : 35 Inkubační doba : 12 hodin Oslabení postih : maximum životů sníženo o 40 po celou dobu trvání infekce Základní doba trvání : 3 dny					